

29. octobre. 1761

N^o. 20.

Observation sur un Accouchement
terminé par une Opération qu'on croit nouvelle

&

555

Mémoire
Sur L'hystérotomie avec la
Description d'un Instrument pour exécuter
Cette Opération



ARC 27 d 42

1840

Received of the Treasurer of the



of the sum of

Five hundred

1

*Observation Sur un Accouchement Terminé par
une Opération qu'on croit nouvelle.
Quæsiui Coelo Lucem.... Virg.*



Le Catalogue des choses possibles qui n'ont pas encore existé ou dont l'existence n'a pas encore été remarquée, augmente tous les jours, par les soins & sous les yeux des Observateurs. Si l'événement dont je vais avoir l'honneur d'informer l'Académie Royale de Chirurgie n'est pas de ceux qui ne sont pas encore arrivés, Il est (au moins à ce que je pense) du nombre de ceux qui n'ont pas encore été observés & rendus publics. Si je ne me trompe point dans cette assertion, on ne connaîtrait pas encore toutes les Difficultés insurmontables qui s'opposent à l'accouchement, & quoique on ait souvent parlé de celle que je rencontre dans le mois d'Avril dernier, les Accoucheurs ne nous la représentent que comme un Obstacle qui a toujours cédé à l'action de leur main, ou aux autres moyens qu'ils ont employés. C'en était effectivement bien assez de reconnaître pour l'accouchement impraticable par les voies & les moyens ordinaires, celui ou la Conformation vicieuse du bassin s'oppose à la sortie de l'enfant: & si le Cas qui fait le Sujet de cette Observation était fréquent, ce serait, pour les Suites d'un Mariage, un nouveau Sujet de crainte & de dégoût d'autant plus capable d'en éloigner, que, différent du vice de Conformation du Bassin, il ne peut être soupçonné par aucun signe extérieur.

Sous jeter du jour sur le fait dont il s'agit, il est nécessaire ^{de donner} un précis de la vie, des mœurs & du tempérament de la personne. Comme malgré le péril urgent qu'elle a couru l'événement a été des plus heureux, & que la matière, à certains égards est fort plaisante, Je supplie l'Académie de n'en être pas moins persuadée de mon profond respect. Si, quelque fois dans ce récit, je m'éloigne de ce style grave & et simple qui convient aux ouvrages qu'on lui adresse. Neque Sempiternum Aram Tendit Opello.

Une vieille fille, c'est à dire, une fille qui compte 51 Ans révolus, d'une constitution Biliuse-Mélancholique, était sujette dès l'âge de 15 ans à des Vapeurs Érotiques dont elle essuait deux ou trois violents accès par année. Les Accès étaient interrompus par des Exacerbations qui revenaient tous les quatre ou cinq ~~jours~~ jours, dans les quelles elle disait toutes les impertinences & faisait toutes les sottises qui caractérisent cet état. La durée de l'accès général était de Cinq à Six Semaines. Quand la fin en approchait elle tombait dans un abattement, une taciturnité, excessives: autant elle avait parlé, autant elle se taisait: elle ne répondait ~~rien~~ que le moins qu'elle pouvait et toujours par Monosyllabes; elle aurait souhaité être toujours seule. La pudeur si longtemps bannie de ses discours & de ses actions semblerait prouver son retour par un air finide & une Contenance honteuse. Elle gémissait, soupirait, —

flourait sans sujet: mais pourtant peu à peu ce grand chagrin se dissipait, elle était moins accablée, ses yeux devenaient plus serains, ~~moins~~ son maintien plus ferme & moins embarrassé & la parole lui devenait moins contournée. Enfin elle se trouvait délivrée de tous ces fâcheux Symptômes jusqu'à la prochaine récidive.

Sans être belle elle avait été jolie dans la jeunesse, & sur ses propres aveux et ceux de quelque autre, il est certain qu'il se présenta plusieurs partis. Les uns voulaient se marier, les autres voulaient seulement l'amuser. Elle ne n'a pas nié que l'intention de ces derniers quoique peu Canonique ne lui plût davantage que le mariage & que dans le nombre de ses Amants il ne s'en soit trouvé qui l'eussent rendue sensible sans un obstacle qui l'opposa à ses penchans. Une tante sielle vieille & dévote surveillait sa conduite avec la dernière exactitude, & voulait que sa nièce fût dévote autant qu'elle, mais elle le voulait d'une façon qui rendait la chose nécessaire ou au moins les apparences. Quoiqu'il fût des desirs et des occasions que la vieillesse manquait, elle garda ^{donc} un célibat fort austère & très cruellement senti pendant tout le reste de la vie de cette tante qui vint enfin à mourir & qui vû l'âge où elle laissait alors la nièce (à peu près 44 Ans) pouvait avec beaucoup de vraisemblance se flatter que la Virginité demeurerait intacte. La nièce jouissant enfin de toute la liberté qu'elle pouvait souhaiter & pour laquelle elle avait peut-être souvent fait des vœux, on croirait qu'elle en profita?... Soit du tout. Je ne sais où elle avait acquis une lumière de pratique qui la détermina à sacrifier encore ses desirs à sa réputation pendant quatre ans entiers qui s'écoulèrent depuis la mort de cette tante jusqu'à la cessation de ses règles. Elle entrevoit qu'alors elle serait libre de toutes les craintes qu'on doit avoir quand on met sa réputation au hazard des mélangemens qu'un homme peut également avoir & n'avoir pas. On ne croirait jamais que ce temps si souhaité étant enfin venu, elle n'ait pas commencé aussitôt à satisfaire une passion contrariée pendant tant d'années... On se tromperait encore, pour mettre le comble à la prudence, elle eut la force de s'imposer la vie célibataire pour deux années au-delà. Elle fut donc environ six ans maîtresse de ces ~~desirs~~ des desirs qui la tourmentaient, malgré l'âge, aussi vivement que jamais, & elle préféra la vie malheureuse qu'elle avait menée jusqu'à ce jour à une autre train de vie qu'elle se figurait beaucoup meilleur. Ces deux dernières années expirèrent enfin en 1760. Croiant alors bien fermement ne rien risquer pour les suites de son commerce, de quelque façon qu'en agit celui qu'elle favoriserait de ces rares promesses, elle jeta les yeux sur un homme presque aussi âgé qu'elle. Or, après ce dernier trait de Prudence je demande si, pour le dessein qu'elle avait, de toutes les précautions qu'on peut humainement prendre, il en restait quelqu'une qu'elle eût oubliée?... Voici cependant comme il lui en prit.

Cet Amant raisonna selon le cours ordinaire de la nature & conclut qu'il était presque physiquement impossible qu'un arbre (pour me servir de ses propres paroles) qui ne fleurit plus portât encore des fruits. D'après cette conclusion, il voulut bien faire un péché, mais malgré les remontrances qu'elle ^{elle} lui en fit garder d'oublier de lui faire, il crut qu'il y aurait une sorte de superstition à en faire deux pour une fille qui passait son demi-siècle. Il s'épargna donc celui d'Ennui, mais en revanche il commit l'autre dans toute l'étendue des pouvoirs qu'il lui en restait à tous deux. Il en usa ainsi pendant plusieurs mois & sa maîtresse

à l'abri des précautions que lui avait suggérées sa prudence goûtait dans une sécurité profonde des plaisirs qu'elle devait incessamment racheter par des Larmes bien amères. En effet quelle que puisse être la Loi commune de la nature, cette fille n'était pas dans la Règle elle était donc dans l'exception, car l'arbre qui ne fleurissait plus ne laisse pas que porter du fruit comme un Arbre de 20 Ans. Comme particulièrement de l'un & de l'autre Je fus choisi pour conduire à la fin cette aventure inespérée. À la fin régulièrement depuis le sixième mois de la grossesse (*). Le temps d'accoucher étant venu elle commença à sentir des douleurs comme à l'ordinaire, qui furent en augmentant très vivement pendant les douze premières heures. Les eaux s'écoulèrent dès le commencement. Les douze heures passées les douleurs se ralentirent & pour la fréquence & pour la vivacité. Chaque fois que je la touchais, je trouvais l'Orifice interne exactement au même point, savoir dilaté de la grandeur d'un Œuf de 6^e. & quelque chose que je pusse faire, je ne réussis pas à le dilater davantage. J'emploiai l'huile, la graisse, le Beurre, l'eau tiède simple, l'eau de graine de Lin, c'est-à-dire, des linges imbibés de ces Substances, introduits dans le Vagin & appliqués sur cet Orifice afin de le relâcher, pendant que de temps en temps avec mes doigts glissés entre la Matrice & la Tête, que présentait l'enfant, j'essayais d'augmenter le passage: mais tout cela inutilement. Je sentais sous mes doigts l'Orifice former un bourrelet lisse, poli, peu épais cependant, mais qui, naturellement aurait dû l'être moins. Depuis que les douleurs avaient commencé à diminuer je perdais 24 heures à toutes ces tentatives infructueuses. Virent donc plus de 36 heures de travail écoulées sans apparence de succès prochain, je proposai d'appeler du conseil. Ce n'est pas que certaines femmes n'aient des travaux beaucoup plus longs & n'en n'accouchent pas moins heureusement: mais cette dilatation du passage qui depuis plus de 30. heures paraissait invariablement fixée à l'étendue d'environ un pouce et demi sans augmenter d'une seule ligne, l'affaiblissement des douleurs, leur éloignement tout cela annonçait quelque chose qui n'était pas naturel: je proposai, dis-je, d'appeler du conseil. La Demoiselle déclara qu'elle mourrait plutôt que de souffrir qu'aucun autre la vît dans l'état où elle était, & qu'elle se résolvait à toute extrémité. Après une déclaration aussi positive, il aurait été inutile de tenter de la faire revenir à un autre sentiment. Nous n'étions que quatre avec la malade, Le Père, moi, & deux femmes, dont l'une qui était dans le secret & dont l'autre pleurait déjà la maîtresse comme morte, l'autre se trouvait presque mal de peine & de répugnance. Le Père ne perdait point la Tête, la Demoiselle quelque douleur qu'elle sentît ne perdait point courage non plus, ou pour mieux dire, sa résignation à tout événement était entière, car son état, malgré cela, ne laissait pas que de l'inquiéter. Moi seul j'étais plus embarrassé que tout le monde, & d'autant plus encore que, pour ne pas augmenter la honte de la Demoiselle ni de ses femmes, je me contraignais à affecter une grande sécurité. Nous passâmes encore douze ou quinze heures à continuer, sans aucun effet les Somentations relâchantes. Pendant ce temps je lui fis prendre plusieurs lavements tantôt simplement emollients & mucilagineux, tantôt un peu acres, selon que j'étais dominé par l'idée de relâcher ou de stimuler.

(*) Ce fut pendant les trois mois suivants que, voyant cette Dame trois ou quatre fois la semaine et n'ayant guère de plus en plus la Constipation, j'appris dans les Confessions qu'elle me faisait tout ce que j'ai rapporté concernant la partie de l'avis antérieure à la grossesse.



~~Enfin~~ Je la saignai deux fois dans les deux premiers jours. Elle n'était pas fort sanguine & cela me parut devoir suffire. Je voulus lui faire faire usage de Solutions huileuses, mais elle les vomissait sur le champ. Elle avait quelque peine à uriner: je la sondai & je vidai absolument la Vessie. Mais tous ces accouvoirs ne faisaient pas un grand changement ou pour mieux dire, n'en faisaient aucun au principal objet. Enfin après tout ce temps passé les douleurs étoient presque nullo. L'Enfant qui jusqu'alors avait remué assez vigoureusement, commença à s'affaiblir: le pouls de la mère s'affaissa notablement: Ses forces étoient épuisées (elle en avait peu, naturellement). ~~Le visage & les mains étoient froids~~ Le Visage & les mains étoient froids & couverts de tins entours d'une sueur froide aussi. Tout enfin, annonçait une Catastrophe fâcheuse, prochaine, & que, jusqu'alors, j'envisageais comme inévitable. Cependant voyant que tout dépendait de l'extensibilité de l'Orifice interne qui depuis plus de 50. heures étoit au même point, je me mis à penser aux moyens de donner issue à l'Enfant à quelque prix que ce fût. Sous cet effet il fallait ou éluder la difficulté ou y remédier directement. Je ne voyais pas ~~la~~ de possibilité dans ce dernier parti; tout ce que j'avais fait jusqu'alors n'ayant ^{été} inutile, Je ne soupçonnai même pas qu'il restât encor d'autre moyen à essayer. Eluder la difficulté: le seul moyen c'étoit l'Opération Césarienne, mais je me sentais une répugnance invincible même à la proposer, je la regardais comme un remède aussi terrible au moins que le mal même. J'ajoutais, en idée, l'épuisement qui doit suivre une pareille opération à celui où étoit déjà la malade, & je voyais des Sujets de crainte suffisants pour m'en détourner, quand bien même j'y aurais fait entrer pour rien le soin de ma réputation qui courait un danger manifeste à ~~me~~ exécuter une opération de cette conséquence sans l'avis ni la présence d'aucun confrère: parce qu'enfin dans le cas d'une mauvaise réussite les deux Domestiques ne se seroient plus crues obligées au Secret qu'elles avaient bien promis à leur Maître, mais non pas à moi. Tout cela combiné ensemble me fit prendre la résolution, si je la faisais, de ne la faire qu'à l'instant de la mort, & seulement pour sauver, s'il étoit possible, la vie de l'Enfant.

Réfléchissant de nouveau sur l'Obstacle qui s'opposait à cet accouchement, & me le figurant tel qu'il étoit, & tel que ~~je n'en voyais pas la possibilité~~ je n'en assurais pas la possibilité que j'avais d'introduire, quoique avec un peu de peine, mes doigts entre la tête de l'Enfant & la Matrice; il me vint dans l'esprit d'agir sur cet Obstacle même, & d'y faire une Opération dont, à la vérité, je n'avais jamais entendu parler, mais que, par analogie, je me persuadai ne devoit pas être d'un succès plus douteux que la Taille & beaucoup moins, suivant moi, que la Section Césarienne faite à une femme vivante. Je rassemblai toutes mes idées sur la possibilité de la guérison d'une plaie telle que celle que je méditois de faire. D'ailleurs

- 1^o Je n'y voyais pas de plus grand inconvénient que celui de la mort dont elle étoit menacée même en ne lui faisant rien.
- 2^o Le hazard de la mort étoit sans doute moindre que dans l'opération césarienne, n'y eust-il que l'hémorragie qu'il étoit à présumer, ou la moindre quantité & la différence de Structure des parties, devoit être ~~traverse~~ (supposée toutes fois qu'elle arrivoit) beaucoup moindre dans un cas que dans l'autre.

3^e Je pouvais opérer sans cet appareil effrayant, mais nécessaire à la Section Césarienne.

4^e. Comme j'avais tout à ménager ce n'était pas un léger motif de détermination pour moi en faveur de ce que je me proposais, que l'obscurité dans laquelle je pourrais opérer & dérober mon opération aux yeux des hommes présents.

Toutes ces réflexions faites je me déterminai à un parti que je laisse à l'Académie à approuver ou à condamner, mais qui en tout cas fut suivi du plus heureux succès.

Je résolus de fendre ce Bourrelet que je ne pouvais ni amollir ni dilater. Je fis part de mon dessein au Père qui, après quelques difficultés que je levai pleinement, s'y rendit. Sous la Mère elle n'était plus guères en état d'être consultée; ainsi sans lui en parler & sans rien donner à connaître aux deux Femmes, tenant dans ma main droite un Bistouri courbe dont la Lame était assujettie avec la Chasse au moyen d'une bandelette qui ne laissait qu'environ un demi-pouce de la pointe de découvert, ayant introduit l'Index gauche entre la Tête de l'enfant & la Matrice, je fis (ainsi que le montre la VI^{me} figure de la 1^{re} Plaque) une Incision qui courait dans l'étendue d'environ un demi-pouce le côté gauche de l'Orifice interne. Je changeai promptement le Bistouri de main et introduisant l'Index droit du côté droit comme j'avais fait l'autre de l'autre côté, je fis à cette partie du bourrelet une Incision qui était plus grande que la première, car elle pouvait bien porter environ un pouce. La malade ne sentit presque rien, quoique ce Bourrelet fut résistant au point de faire quand je le coupai un bruit aussi fort que le fait quelques fois l'Anneau des Muscles du bas Ventre dans quand devenu presque Carthilagineux dans les hernies anciennes. Il ne sortit presque pas de sang. L'avantage de cette Manœuvre ne fut pas longtemps douteux. Avec peu d'efforts j'introduisis ma main et tirai presque aussitôt un assez gros enfant mâle qui ne demandait qu'à sortir & se présentait bien, mais qui était si faible qu'à peine jeta-t-il quelques cris. Huit ou dix Minutes après, je tirai sans difficulté un Ombilico-faire bien conditionné. Le sang ne coula que comme il coule ordinairement. Après l'avoir accommodée comme on fait toutes les autres elle fut remise dans son lit. Je lui fis prendre dix gouttes d'Elixir de propriété dans un petit goblet de vin vieux. La Tête se remit peu à peu; les forces revinrent ainsi que la parole qu'elle avait perdue de pure faiblesse. Au bout d'une heure je lui fis donner une Tasse de bon Consommé, après quoi elle fit un somme d'environ deux heures. Elle passa tranquillement la journée (elle accoucha vers deux heures du matin). Je m'informai plusieurs fois dans le jour si elle sentait de la douleur dans le Vagin, en quel endroit & quelle sorte de douleur; elle me répondit qu'elle n'en sentait d'aucune sorte nulle part. J'attendais avec quelque inquiétude la fièvre de lact, mais elle n'en eut point. J'appelle n'en point avoir que d'en estre quitte pour un petit malaise qui dura environ sept à huit heures au plus, sans frisson, sans gonflement ni douleur du Sein. Les Lochies coulerent en petite quantité, et dès le lendemain matin n'étaient déjà plus que des Serosités légèrement teintes. Cette Evacuation augmenta un peu vers le quatrième jour & depuis ce temps fut toujours en diminuant de jour en jour & la Malade de mieux en mieux.

Quelque soigneux que je fusse d'examiner les Linges qu'on lui était Je ne pus y remarquer la moindre trace de pus. Elle me dit le 8^{ème} jour qu'elle sentait une grande démangeaison dans le fonds du Vagin: J'y fis matin & soir pendant 10 jours une injection de terpeve. Tout s'éclaircissant ayant enfin absolument cessé vers le 20^{ème} jour après la couche je ne fis plus que lui prescrire un léger minéralif qui fut encore répété huit jours après. Enfin elle sortit parfaitement rétablie aux fesses de la Sente côte dernière.



Tel est le fait dont j'ai cru devoir donner connoissance à l'Académie & à l'occasion duquel on peut faire des questions de plusieurs sortes: Les unes concernant la Maladie dont il est question & les rapports qu'il y a entre la vie, son tempérament, ses mœurs, & cette grossesse inattendue, & cette difficulté extraordinaire qui l'opposait à l'accouchement. Les autres concernant les différents phénomènes de la Couche; Les autres enfin sur l'opération dont je viens d'entretenir l'Académie, la possibilité, son utilité, & la distinction des Cas où elle est préférable aux moyens ordinaires d'avec ceux où elle est ou inutile ou nuisible. Toutes ces questions se réduisent à peu près à celles cy.

1^o Quel est donc le signe qui peut assurer de l'infécondité d'une femme, si celle cy a été d'autant plus dupée qu'elle a pris plus de précautions?

2^o Deu pouvait provenir une telle inextensibilité dans une partie qui je crois, n'en n'a pas donné encore un exemple connu & rendu public avant celui cy?

3^o Pourquoi en deux jours & demi cette Personne a-t-elle été réduite à un état de faiblesse plus grande que d'autres femmes après des travaux de cinq & six jours? —

4^o Le défaut de ferre, de gonflement de Mamelles, de lait est-il dépendant de l'âge ou de la faiblesse de l'accouchée, ou de l'insensible suppuration des deux plâies?

5^o Dans un Cas tout semblable à celui qui fait le Sujet de l'Observation doit-on prendre d'autre parti que celui d'inciser l'Orifice interne de la Matrice?

6^o Dans d'autres Cas, l'Incision de cet Orifice peut-elle être préférable aux moyens connus & usités?

7^o Quels sont les Instruments les plus capables d'exécuter cette opération avec promptitude & Sécurité? & quel en est le manuel? —


Comme l'unique but que je me propose est le bien de l'humanité, & la gloire d'un Art que je chéris qu'il me soit permis d'exposer & de soumettre au jugement de l'Oracle de la Chirurgie mes réponses à ces questions, & les vœux que la Cas Singulier qui les occasionne m'a fait naître.

Je répondrai un peu au long aux trois dernières demandes, étant celles dont la discussion doit éclaircir ce point de la Chirurgie pratique: Je glisserai légèrement sur les quatre autres dont l'objet n'est qu'une Pathologie plus curieuse qu'utile, & surtout sur la première qu'on pourrait presque regarder comme étrangère au Sujet que je vais traiter, ^{mais} la singularité de l'aventure qui porte naturellement l'esprit à faire cette opération.


Première question

Quel est le signe qui peut assurer de l'infécondité d'une femme si celle dont il s'agit a été d'autant plus dupée qu'elle a pris plus de précautions? —

La personne dont il s'agit regardait l'évacuation Menstruelle comme un préalable essentiellement nécessaire à la Conception. Les apparences étaient pour elle en pensant ainsi: mais elle ne savait pas ou elle ne pensait pas qu'il n'est pas fort rare de voir des femmes chez qui cette évacuation réparait, chez quelques unes plusieurs fois, longtemps après avoir semblé cesser pour ne plus revenir, & que si cette circonstance est nécessaire à la conception, il y a par conséquent beaucoup de femmes qui peuvent se trouver grosses plusieurs années après le temps qu'elles ont continué de regarder comme l'Époque de leur Stérilité. N'étant guères possible de distinguer ces femmes d'avec celles qui ne leur ressemblent pas à cet égard, il faisoit qu'on ne peut en taxer aucune d'une Stérilité absolue sur le seul fondement, qu'elle n'est plus réglée, il faisoit en outre que la Stérilité Absolue n'existe peut-être ~~en aucune~~ dans aucune de celles qu'on en









vii

soupçonnerait le plus volontiers, & ce n'est chez elles qui n'auraient point de matrice d'autant (S'il
 l'on trouve, car l'histoire de la fille qui n'ayant aucune des parties génitales externes, ne laissa pas
 que de concevoir à la suite d'un Commerce Anti-phisque en apparence, ne prouve point que cette
 fille n'eût point de Matrice) Le Norilite Absolu, dis-je, n'existe peut-être nulle part puisque les
 imperforées telles que celles dont on voit l'histoire dans L'Anthropographie de Richan Lib. 2. & dans
 L'observation de 383 de Mauriceau, n'ont pas laissé que de concevoir, & que d'ailleurs les femmes
 qui n'ont ~~pas~~ encore jamais été réglées (Broussard Comment. du 36 Aphor. du 5^{me} Livre d'Hippocrate
 Boullier de Curand. morb. Lib. 1^{re}) conçoivent aussi bien que les autres. Il s'ensuit enfin, qu'il n'y a
 point de ligne positif & infallible de Stérilité.

Deuxieme question.

On pourroit provenir une telle incensibilité dans une partie qui, je crois, n'en a pas
 donné en cor un exemple rendu public avant celui-ci?

Cette incensibilité est nécessairement un vice dépendant de la première formation
 ou une mauvaise disposition acquise. Il est certain que la nature s'écarte quelque fois de
 la marche ordinaire, mais comme, à tout prendre, l'exception n'a tout au plus lieu que pour
 100, en general; quoiqu'il ne soit pas impossible que ce soit ici un vice de Conformation, il y a
 au moins 100 contre 1. à parier que c'est une indisposition acquise: & dans cette dernière hypothèse
 il n'est pas difficile, d'après le détail de la manière dont elle a passé les années de son Célibat, de
 soupçonner ce qui peut y avoir donné lieu. Quel était son état pendant les deux tiers de sa vie
 précédente? Elle était exposée à de violents accès de fureur Vénérienne. Or, quelle est l'humeur
 qui cause cette maladie? quelle est sur quelle partie agit-elle? Il est vraisemblable que cette
 humeur est la Semence, ou autre liqueur, de quelque nature qu'elle soit, que verse la femme
 dans le Coût; personne n'ignore la sensibilité exquise de l'Orifice interne de la Matrice qui
 sans doute est le sujet passif des titillations irrésistibles qui produisent la fureur Vénérienne.
 Cette humeur, (Seminale ou non) accumulée et retenue longtemps dans les canaux & réservoirs
 en sort enfin à la première titillation assez forte pour l'en chasser, mais apparemment qu'elle
 ne s'échappe pas toute entière hors de la Matrice, & que la portion qu'il y en reste y fermente
 & s'agrite & devient capable d'agiter d'irriter les fibrilles nerveuses qu'elle baigne; De là
 les Paroxismes, qui dans la Demoiselle dont nous parlons revenaient tous les quatre ou cinq
 jours, parce que sans doute il fallait cet intervalle de temps pour que la ~~reste~~ portion d'humeur
 restée dans la Matrice ~~devenait capable d'agiter d'irriter les fibrilles nerveuses qu'elle baigne~~ au temps du dernier
 Paroxisme, & acquit un degré de dépravation égal à celui qu'avait le résidu semblable
 qui causa le pénultième paroxisme. Or ces titillations répétées brutalement durant, quelquefois
 pendant plus de quatre mois & chaque année (à rassembler la durée particulière de chaque
 accès, ne peuvent-elles pas, à force d'avoir mis en contraction ces fibres nerveuses, leur avoir
 ôté peu à peu leur souplesse? On se servirait ici volontiers du proverbe connu, Un Arc
 toujours bandé perd enfin son ressort. En effet si pour étendre un Arc bandé assez
 violemment & depuis assez longtemps pour que son élasticité soit devenue inverse de ce
 qu'elle était relativement aux surfaces, il faut autant & même plus de force que pour

baudet cet air lorsqu'il était dans son premier état pourquoi la même chose n'arriverait-elle pas aux fibres animales ainsi qu'aux fibres végétales & métalliques? L'Elasticité est l'effet d'une Cause qui est partout la même. ~~Donc ce n'est pas de la nature de l'air qui agit au~~

Troisième question.

Pourquoi en deux jours & demi cette femme a-t-elle été réduite à un état de faiblesse plus grande que certaines femmes après des travaux de cinq ou six jours?

Je pense que quatre ou cinq causes ont concouru à produire cet effet. 1°. la délicatesse de sa Constitution. 2°. l'insensibilité de l'Orifice interne, sur la sensibilité duquel il n'est pas besoin de s'étendre non plus que sur le degré de violence & la multiplicité des tentatives qu'il a efflué. 3°. Les angoisses & la Contention d'esprit que lui causait la crainte de faire naître quelques soupçons dans son voisinage. 4°. Les efforts qu'elle se faisait pour dérober les douleurs sans crier. 5°. Enfin la peur de la mort, qui, quoiqu'elle résignation qu'elle affectât, ne laissait pas (comme elle l'a avoué depuis) que de lui avoir fait une impression très vive.

Quatrième question.

Le défaut de fièvre, de gonflement de Mamelles, de lait, est-il dépendant de l'âge c'est-à-dire de la Cessation des règles; de la faiblesse de l'accouchée, ou de l'insensible Suppuration des deux plaies?...

Lorsque la Nature n'a point donné des mamelles & du lait à la femme qu'elle fin de nourrir son enfant, il est pourtant certain que plusieurs femmes accouchent sans qu'il se fasse en apparence la moindre goutte de lait dans leur Sein. La Mécanique de cette précieuse Métastase qui reporte aux Mamelles le Sang qui afflue à la Matrice manquerait-elle chez quelques unes?... C'est la fonction de certains Vaisseaux qui ne s'oblitérent pas comme les mêmes leur mes en font elles mêmes la preuve: car d'ordinaire quelque petit & flaccide que soit leur Sein, ou se faisant têter par un enfant un peu fort ou par une grande personne peu à peu le lait leur vient; Il faut donc trouver la Cause de ce défaut dans quelques unes des Circonstances relatives au tempérament de la Malade ou à l'accouchement même. Les femmes qui se trouvent dans ce Cas sont communément ou extrêmement faibles & languissantes, comme des Asthéniques des Cachectiques celles qui sont sujettes à des hémorragies considérables en conséquence d'une mauvaise qualité de leur Sang: ou elles commencent à être vieilles: ou plus la Sténie, la Cachexie les hémorragies ont épuisé et altéré la constitution, plus on avance en âge; & moins on a de Sang: & moins on a de Sang & moins les vaisseaux font d'efforts pour se décharger sur d'autres d'un fluide dont la quantité ne les gêne pas. Et il est vrai aussi jusqu'à un certain point que moins il y a de ce fluide & moins son mouvement est rapide. Or nous avons remarqué plus haut que la personne dont il s'agit n'était nullement sanguine. Elle avait été saignée malgré cela deux fois: en outre la plupart des raisons qui font la réponse à la question précédente, tout cela dis-je réuni et combiné a dû ne lui laisser avoir que bien peu de fièvre, peu de Lait, & peu ou point de lait d'autant que les Lochies coulaient bien. Et l'égard de la Suppuration des deux plaies je la crois trop peu considérable pour

avoir détourné en entier toute la portion de sang qui aurait été destinée à ~~la~~ la Placenta.
Cependant quoique je n'aie remarqué aucune trace de pus, ce n'est pas à dire que les deux plaies
se soient réunies sans suppuration, mais seulement qu'elle a été en si petite quantité, comme
il arrive à toutes les parties membraneuses (& celle la l'était devenue, comme le prouvent la
résistance à être étendue et le bruit qu'elle fit sous l'instrument tranchant) qu'ayant été
dilatée par l'humour des Lochies elle aura coulé avec elle sans le faire remarquer.

Cinquième Question

Dans un cas tout semblable à celui qui fait le Sujet de l'observation cy dessus, doit-on
prendre d'autre parti que celui d'inciser l'Orifice interne de la Matrice?

Sur l'énoncé même de la Proposition, l'ouchement est supposé impossible. Si l'on s'en remet
aux seules forces de la nature, aux relâchans aux émolliens, à la saignée, aux
lavemens Stimulans, & même à un moyen plus efficace encore que tout cela, je veux
dire à l'action de la main. Reste donc à employer les instrumens connus sous le
nom de Dilatatoires, ou de faire l'incision proposée, ou enfin de laisser périr ou l'enfant
ou la mère, et peut-être l'un & l'autre. Je ne parlerai point de la préférence que doivent
avoir les deux ~~premiers~~ ^{premiers} partis, ni le dernier, si quelque fois on a pu le prendre (le dernier)
c'est le comble de l'opprobre de l'art.

Il n'est pas nécessaire de le mettre beaucoup en frais de preuves pour démontrer que l'incision est
préférable à la dilatation forcée qu'opèrent les Dilatatoires. La sensibilité exquise de la partie
sur laquelle ils agissent, & la nécessité que les fibres de cette partie continuent à être élastiques
suffisent pour les proscrire. Si l'on prouve qu'il existe des ~~moins~~ ^{moins} & moins douloureux dans
le tems de leur action, et moins à redouter pour les Suites. On dira que quelque sensible
que soit cette partie elle subit quelquefois des efforts assez presque aussi considérables que ceux
des Dilatatoires sans qu'il en résulte d'accidents; comme par exemple lors qu'il passe de gros
enfants. A cela je réponds qu'entre cette Dilatation qu'on peut appeler naturelle & l'action
des instrumens il y a des différences manifestes. La Dilatation naturelle se fait par degrés
insensibles, au lieu que les Dilatatoires, avec quelque ménagement qu'on les emploie, opèrent
toujours plus brusquement que la Nature.

Il suffit qu'une puissance quelconque tende à mettre une fibre au dessus ou au dessous de son état
naturel, pour que cette fibre lui oppose infailliblement une certaine résistance dont le terme extrême,
quand cette puissance a une tendance à l'extension est le déchirement, & quand elle agit en
sens contraire, est l'éclatement. On attente à la fois ces deux termes opposés dans l'usage
des Dilatatoires. Contusion, Éclatement, des fibres sur lesquelles ils agissent comme d'habitude,
Déchirement, ou tout au moins Paralysie de ~~celles~~ qui se trouvent entre les différents points
d'appui de leurs branches, deux maux dont le moindre est toujours trop fâcheux puisqu'on
peut les éviter l'un et l'autre par la résistance, qui cause tout le malheur, devenant nulle ~~avec~~
avec l'instrument tranchant.

La Dilatation naturelle se fait sur tous les points de l'Orifice interne à la fois, au lieu
que les Dilatatoires n'agissent que sur quelques points séparément, et par la même
sont capables de causer la contusion de certaines fibres & l'Atonie des autres.

On fera une Objection spécieuse : Personne, dira-t-on, n'ignore combien la dureté d'une Cicatrice s'oppose à l'extension, à la dilatation d'une partie, Si la personne à qui on fait cette incision est encore dans le Cas d'avoir des enfants par la suite, l'Obstacle que la Cicatrice de l'incision fait à la dilatation de la Matrice n'est-il pas un inconvénient assez considérable de cette opération pour la faire priver ? La Végaline ne doit pas paraître problématique si l'on fait attention que ce prétendu Obstacle se réduit à presque rien.

1°. Lorsqu'une Cicatrice oppose une inextensibilité notable, il faut qu'elle ait une certaine étendue au moins selon deux dimensions, telles soient celles de des brûlures, des grands Abcès, des plaies avec perte de Substance, ou dont les lèvres n'ont pas resté contiguës : Et les plaies que je propose de faire à la Matrice ne sont point appliquées de dépendances de Substance : D'ailleurs la position de cet organe entre la Vessie & le rectum qui le compriment mollement & continuellement rendent nécessaire la contiguïté des lèvres des plaies faites aux parties latérales de son Orifice. N'a-t-on pas l'exemple commun de plaies faites à toutes les Substances du Corps, même aux Substances Offensées qui au moins de la Contiguïté se réunissent sans suppuration, au moins sensible. ~~Les plaies peuvent se réunir ainsi~~ Pourquoi la même chose serait-elle impossible à la Matrice ? & si les plaies peuvent se réunir ainsi il est évident que soit la Cicatrice par l'étendue de la quelle on voulait effrayer, réduite à une simple ligne Mais ce n'est pas encore tout.

2°. Dans quel état était la Matrice au lens de l'Incision ? Communément elle porte plus d'un pied de largeur, ne lui Supposons qu'un pied : Dans l'état naturel, à une femme qui a eu des enfants et qui est encore en âge d'en avoir (C'est assurément prendre le cas le moins favorable) elle occupe, au plus, un espace de trois ou quatre pouces de large ; & c'est à cette substance élastique comme on sait qu'elle l'est, étendue presque à son plus haut point (je dis presque, parce que je suppose les eaux étouffées) qu'on fait une incision d'un pouce de long (je suppose la plus grande étendue qu'on puisse lui donner, comme on le verra plus bas) or si l'étendue de la Matrice avant l'accouchement est à l'étendue qui lui reste après que la femme est tout à fait délivrée, et que les Lochies commencent à diminuer, comme douze font à quatre, il s'ensuit que ces incisions d'un pouce de long vont se réduire aussi à quatre lignes. Mais, en outre, si, au lieu de prendre les choses sur le pied le plus favorable à l'Objection, comme je l'ai fait, on les prend sur le pied le plus favorable à l'opération & qu'on suppose une Matrice qui dans son état naturel n'aurait que deux ou trois pouces de largeur au lieu de quatre, à la quelle ~~on~~ il ne serait nécessaire de faire qu'une Incision de six lignes au lieu d'un pouce ; que deviendra l'Objection ? ... n'est-il pas évident et de montrer qu'il n'y a pas la moindre chose à redouter par rapport aux grossesses subséquentes.

Mais enfin, dira-t-on, pourquoi proposer une Opération pour des Cas si rares que bien des Praticiens ne les trouveront qu'une seule fois dans tout le cours de leur ~~pratique~~ vie et de leur pratique ? ... Ces Cas sont rares... on en convient, & on en félicite l'humanité bien sincèrement ; mais dès lors qu'il en est arrivé un & que par conséquent leur possibilité est démontrée pourquoi ne rendrait-on pas publics les moyens qu'on a pris & la conduite qu'on a tenue pour y remédier ? Un premier Accus est une besogne de boussole pour la suite.



Dans d'autres Cas, l'Incision de l'Orifice interne peut-elle être préférable aux autres connus & usités? & quels sont ces Cas?

La Généralité des Accouchements contre nature peut être divisée en deux classes, suivant que les inconvenienss qui les constituent tels, dépendent plus particulièrement de la Mere ou de l'Enfant.

Les inconvénients qui dependent ou qui affectent essentiellement la mere se peuvent reduire aux
 Les suivants. La Mauvaise Conformation. La Syncope. Les Convulsions. La perte de sang.
 La Paralysie de la Matrice & surtout de son Fond. Le Spasme Tonique des fibres Musculaires
 de son Orifice interne, & enfin la rigidité de ce même Orifice.

Les difficultés de la part de l'enfant ou de ses dépendances, ont l.^{re} quand il est tellement épuisé par un travail de plusieurs jours qu'il n'est plus capable de faire le moindre effort pour sortir, ou bien lorsqu'il est mort. 2.^o Quand il est trop gros. 3.^o Quand il y en a plusieurs.

3^e. Quand il a quelque partie monstrueuse. 4^e Quand il est mal situé. 5^e. Quand le Cordon Umbilical sort, est froid et gonflé et ne peut être réduit. 6^e Quand l'arrière-faix est détaché.

Section 1^{re}.

Sectioni 1^{ura}.

Si. De tous les Cas qui rendent un accouchement difficile il n'y en a peut-être pas un où l'incision de l'Orifice interne soit plus complètement inutile que dans celui du Vice de Conformation du bassin. On en sent trop les raisons pour qu'il soit nécessaire de détailler à combien de titres l'opération Césarienne est nécessaire : elle ne l'est probablement ~~que~~ dans cette circonstance, mais aussi elle y est indispensable. On conçoit bien que je suppose ici ce vice de Conformation assez considérable pour qu'il n'y ait aucune ressource par d'autres moyens et d'autres voies.

Sn. La Syncope, les convulsions, La Serte de sang. Les deux premiers ~~acc~~ de ces trois accidents
sont assez souvent causés par l'excès du troisième, ou ~~diu~~ quelques-fois ils arrivent &
ils existent séparément et successivement ~~l'un après l'autre~~ et se combinent entre eux en diverses
manieres. Quoiqu'il en puisse être de leurs combinaisons, le point de réunion que nous avons à
considérer est le peril urgent qui menace alors & ~~le~~ l'enfant & la mere. Tous les matriciens
faisant consister la salut de l'un & de l'autre dans l'accouchement fait le plus promptement
qu'il est possible & les raisons en étant palpables, la question se réduit à savoir la quelle des
deux Methodes (La Dilatation lente & graduée de l'orifice interne par l'action de la main, ou
L'incision de ce même Orifice) la quelle, dis-je, des deux Methodes attendre plutôt ~~ce~~ ~~est~~.
Rienque prévenu qu'on puisse être contre l'opération personne ne peut nier qu'elle ne puisse exécuter
en une minute ce que l'on fera quelque fois qu'en une demie heure, ou une heure, ou même
encore davantage par l'aide de la main seule. Reste à savoir si dans chacun de ces accidents
la vie ou de l'enfant ou de la Mere est toujours en un tel danger qu'on ne puisse pas sans leurrer le
hasarder de faire l'accouchement une demie heure plus tard pour éviter l'incision.

1. La Syncope n'est, comme tout le monde, fait, que la cessation de l'écoulement du fluide animal dans les nerfs qui se distribuent aux organes des fonctions volontaires. Cette mort passagère qui repose en quelque sorte les mouvements du Cœur & de la poitrine ne laisse pourtant pas que de les ralentir manifestement l'un & l'autre : c'est à telle cause qui peut ralentir et diminuer

le mouvement du cœur, il ne faut, pour devenir capable de l'arrêter tout à fait, que rien autre chose que l'intensité d'action, ou la plus grande durée. La Syncope seule, peut donc causer l'interruption du mouvement des Sanguins & du Cœur & causer la mort d'abord à la mère en second lieu à l'enfant. Il faut donc tâcher de ^{distinguer} reconnaître à quelques signes une Syncope mortelle d'une qui ne l'est pas. On conjecturera qu'elle menace la vie par la longue durée, par le refroidissement des extrémités, et même de tout le Corps, par l'effluve involontaire des excréments, précédé d'une sueur froide & gluante, par la valeur livide du visage et surtout des lèvres, par une sorte d'écume qui sort des narines, par l'impossibilité de trouver et de reconnaître l'artère par ses pulsations, ni même le cœur par les battements, par l'immobilité de la flamme d'une chandelle qui est présente à l'ouverture de la bouche & du nez, &c. Quand ^{tous} ces symptômes, ou ~~quelques uns~~ seulement se rencontrent quoiqu'il puisse bien se faire que la malade ne meure pas il est toujours incontestable qu'elle & son enfant courent un danger très grand auquel l'accouchement seul peut les arracher (au moins l'enfant) Pourquoi alors s'amuser à débiter avec les doigts l'orifice qu'on aurait beaucoup plutôt fait de se débiter? Sericulum in morâ.

2°. Si la Syncope est une interruption de l'écoulement des esprits animaux La Convulsion n'est qu'un état moien entre elle et le mouvement régulier et ordinaire. c'est une alternative continue d'une inactivation d'esprit, instantanée, rapide, & violente, & d'une interception absolue & totale. On a dit que le temps ~~de la~~ pendant lequel on souffre des convulsions est entre coupé de plusieurs Synopes profondes & de plusieurs mouvements violents et extraordinaires. La Circulation du sang devient d'une irrégularité funeste et ne s'exécute que par sauts et par bonds, si l'on peut s'exprimer ainsi; elle reste souvent suspendue pendant longtemps ~~les~~ tous les muscles se contractent, La Matrice aidée de l'action violente de tous les Muscles de l'Abdomen comprime l'enfant, et par cette pression intérieure dérange, suspend, et arrête ~~enfin~~ la Circulation qui se fait dans son Corps. Ainsi que dans la Syncope il y a des degrés à observer dans la Convulsion, & en outre il faut remarquer quelle partie elle affecte le plus. Si elle occupe seulement les extrémités & sans trop de violence, si elle n'occupe qu'une partie seule comme un bras, une jambe, les Lèvres, les yeux, seuls, on aura lieu d'espérer qu'elle ne sera pas mortelle à l'enfant ni à la mère avant son accouchement; mais si les Muscles affectés étaient ceux de la Respiration, si c'était l'estomac & qu'il s'en ensuivît des nausées et des vomissements avec efforts considérables, si les Muscles de l'Abdomen étaient agités dans ces mouvements extraordinaires qu'on remarque aux hystériques, si enfin on apercevait des ~~ou~~ roidissements de tout le Corps et une sorte de spasme universel, on aurait tout à craindre sans doute, & comme le danger de vie pour l'enfant croît à proportion du temps qu'il ~~reste~~ ^{est} exposé à cette espèce de Tempête le moyen ~~le plus~~ de le délivrer le plus promptement est celui qui mérite la préférence; ~~Or ce moyen est l'incision de l'Orifice interne.~~

3°. La Sortie de sang, Accident au moins aussi terrible que la Convulsion & la Syncope, est des trois que nous examinons, celui qui met la vie de la mère et de l'enfant dans le danger le plus effrayant & dans lequel cependant on peut, & le plus sûrement se dispenser de l'incision de l'Orifice interne: Le sang qui coule continuellement le relâche et l'humecte à un tel point qu'il ne faut gueres d'efforts pour vaincre le peu de résistance dont il peut ~~être~~ encore être capable après l'épuisement et la faiblesse on est la malade & si est possible d'accoucher la femme aussi bien par la manière ordinaire que par l'incision, pourquoi prendrait-on ce dernier parti? Cependant cette porte ne procurerait, comme elle a coutume de le faire, à l'orifice interne cette facilité de se dilater promptement, soit à cause de l'âge avancé du Sujet soit pour quelque autre raison, & que l'hémorragie continuât avec trop de violence, causant des Synopes.

& des convulsions, alors ne vuse qu'il faudrait recourir à l'Incision, sans attendre plus longtemps.

Je conclus donc que la Syncope & la Convulsion, l'une & l'autre accompagnées de ces symptômes que nous avons rapportés, & qui les font reconnaître pour très-dangereuses & même quelque fois pour mortelles, demandent l'Incision de l'Orifice interne de la matrice, quand même elles seraient prises à part, chacune le seul & unique accident de l'accouchement, & à plus forte raison si elles se trouvaient toutes deux ensemble, ou qu'elles fussent causées par ~~l'excès~~ une excessive hémorragie qui n'aurait pourtant pas rendu l'orifice interne assez dilatable pour espérer de terminer l'accouchement assez vite par la Méthode ordinaire.

S.III. La Paralyse de la Matrice & surtout de son fond, & le Spasme Tonique des fibres musculaires de son orifice interne, ainsi que la rigidité de cette dernière partie.

On considère la Matrice d'une femme, presle à accoucher comme une espèce de Sac composé de deux Muscles Antagonistes l'un de l'autre: les fibres du Muscle Supérieur, servent tout-à-la-fois le contractant à diminuer la capacité de ce Sac. Une partie des fibres musculaires inférieures sont disposées de telle sorte qu'elles resserrent & serrent pour ainsi dire l'espace vuide qui est contenu entre elles. Quand dans le temps de l'accouchement, ce muscle qui occupe le fond de la Matrice, par quelque cause que ce puisse être ne peut se gonfler; ni par conséquent pousser le fœtus de hors ~~par~~ en diminuant l'espace qui le contient, en vain les fibres musculaires de l'Orifice seraient-elles disposées à céder, & vice versa. Quand le troussau Musculaire de cet Orifice, par quelque cause que ce puisse être se trouvait en convulsion et affecté d'un Spasme Tonique, ou ~~qu~~ si cet Orifice était devenu dur & inextensible soit par maladie ou par l'âge, il serait également inutile que le Muscle du fond se contractast et tendît à expulser l'enfant. On conçoit facilement que dans l'un & l'autre cas la Nature peut ne pas se suffire & qu'il est nécessaire que l'Art trouve quelque Moyen pour venir à son secours.

1°. Dans l'Inertie absolue du fond de la Matrice, si cette affection Contre-nature est seule, & que son Orifice soit, comme nous venons de le dire, disposé à se laisser facilement dilater, il faudrait avoir une furieuse démanigaison de cœurs pour oser proposer la l'Incision du Bourrelet de l'Orifice interne, mais la difficulté de connaître cette inertie doit suffire pour rassurer contre les craintes d'une opération précipitée, téméraire, & Superflue. Cette mauvaise disposition ne pourrait se faire conjecturer que par la l'absence des douleurs: mais combien voit-on de femmes à qui les douleurs cessent absolument et dont on termine l'accouchement par la main seule?

2°. Dans le Spasme Tonique des fibres Musculaires de l'Orifice interne; sous l'état de l'utérus de l'opération proposée, en ce cas, je citerai ~~un~~ ^{un} exemple très-analogue au sujet, c'est celui de ceux dont la Tête est tournée plus d'un côté que de l'autre par la Contraction du Sternomastoïdien du même côté: Contraction purement Idiopathique et non dépendante de la l'Paralysie ni de la lésion totale du ~~sternomastoïdien~~ Sternomastoïdien du Côté opposé. Cette Différence que les émollients les relâchants les mieux appropriés n'auront pu corriger, n'est-elle pas curable ou au moins palliable en grande partie par la lésion du muscle contracté? (Sharp Oper. de Chir.) Or ce Torticolis curable par l'opération n'est-il pas précisément la même maladie que l'inextensibilité de l'Orifice interne de la Matrice? La Différence des parties, celles de la figure des Muscles & de leur action, y jette une disparité frappante en apparence: mais, au fond, qu'est-ce que l'un et l'autre? Ex concessis c'est un Muscle Contracté au point qu'il ne peut plus être étendu. Or si dans le Torticolis de l'espace dont nous parlons la Cure s'exécute par l'affaiblissement d'un muscle afin de rétablir entre lui & son Antagoniste cette proportion de force dont dépend

l'équilibre; pourquoi dans un cas semblable & sur des parties de même nature, le même moyen n'aurait-il pas le même succès. Je conclus donc que les moyens ordinaires ayant été inutilement employés pendant un espace de temps convenable, c'est à la Section à achever ce qu'ils ont commencé.

3. La Rigidité & l'extensibilité de l'Orifice interne devenu calleux par Maladie, ou membraneux et même cartilagineux par vétusté.

Quelle que soit, en général, l'extensibilité dont nous parlons, qu'elle soit le produit d'une Cause actuellement agissante, telle que la Convulsion le spasme Conique des fibres de l'orifice, ou qu'elle soit l'effet permanent d'une cause qui n'existe plus, telle qu'un ulcère dont la Cicatrice occupe cet Orifice, ou enfin, qu'elle soit une suite du dessèchement que les années opérant, il importe peu, & même l'opération proposée est d'autant plus indispensable dans les cas de Callosité, ou de dessèchement que ces affections ne sont pas susceptibles de diminution, comme pourrait l'être le spasme Conique. Ainsi je conclus que, dans le cas de Callosité ou l'extensibilité de l'orifice interne de la Matrice serait l'effet d'une Callosité ou d'un racornissement, après les tentatives ordinaires reconnues inutiles, L'incision du bourrelet de la matrice offre un secours prompt, sûr, & préférable à la Continuation opiniâtre des moyens infructueux, et à l'attente souvent mortelle pour la mère ou pour l'enfant, & quelquefois pour tous deux, des efforts de la Nature dont la vigueur ne fait que s'énerver de plus en plus.

Section II^{me}

S.1. Des Sept difficultés qui, rendant l'accouchement contre Nature, sont dépendantes plus particulièrement de l'Enfant ou de ses appartenances que de la Mère, la faiblesse n'est pas celle qui indique le besoin le plus urgent d'un secours extraordinaire. Tous les jours il naît des enfants qui ont si peu de forces qu'à peine donnent-ils quelque signe de vie, & dès avant de venir au jour leur mère ne le sentait point ou très peu remuer. D'ailleurs cette faiblesse est une raison d'autant plus insuffisante qu'il est très vraisemblable que l'accouchement n'est l'ouvrage que des Contractions de L'Uterus & que l'enfant est à peu près absolument passif, à moins qu'on ne veuille dire que les mouvements, irritant et étendant irrégulièrement la Matrice & ne concourent par la douleur qu'ils causent à la fréquence, au renouvellement, et à l'intensité de la sorte de Ténésie qu'il occupe alors ~~la matrice~~. On voit des enfants morts par des accidents arrivés à la Mère comme corps ou chûtes, & morts longtemps avant que le travail commence, on voit, dis-je, ces enfants être expulsés avec les mêmes douleurs que s'ils eussent été vivants. Ce ne sont donc point les mouvements de l'enfant qui causent les douleurs de l'enfantement, & quand le terme est arrivé un enfant, une mole, et tout autre Corps se raient expulsés de même. la faiblesse de l'enfant, Supposé qu'on pût en être assez sûr pour prendre quelque parti conséquent, n'est donc pas une raison pour tenter le ~~mo~~ de délivrer la femme au moyen de l'opération, à moins que cette faiblesse ne se trouve compliquée avec quelqu'une des difficultés qui dépendent de la Mère (Text. pers.).

Si pour l'enfant faible et épuisé mais cependant vivant l'Incision du bourrelet de l'orifice de l'Uterus n'est pas nécessaire elle doit l'être encore moins pour l'enfant mort, à moins que cette circonstance ne se trouve compliquée avec quelqu'une des cas de la section première & dans un degré qui mettrait la vie de la mère en un péril pressant, encor faudrait-il

faire attention aux Conditions dont nous parlerons plus bas.

§ II. De la Grossesse de l'Enfant. Comme nous juger de l'Obstacle qu'oppose la grosseur du fœtus il faut en pouvoir juger par la vûe ou le toucher de quelque une de ses parties. nous examinerons en ce même § les difficultés de la Situation & de la Monstruosité des parties.

1°. Il n'est pas sans exemple que des enfants très gros, après avoir occasionné pendant longtemps de violentes douleurs qui, aidées même du secours de la main, n'ont pu parvenir à dilater l'Orifice au point nécessaire pour leur donner passage, aient enfin péri dans la Matrice d'où on a été ensuite obligé de les tirer par pièces: il est peut-être vrai pour quelques uns d'eux qu'on aurait pu leur sauver la vie au moyen de l'Incision de l'Orifice, mais peut-être ce la n'est-il pas vrai pour tous, à moins qu'on n'eût compté pour rien les dangers qu'on aurait fait courir à la mère, en risquant de faire à la jonction de la Matrice & du Vagin des incisions qui auraient pénétré dans la Capacité du Bassin, (supposé que des incisions d'une moindre étendue n'eussent pu suffire pour le passage de l'enfant.) Reste à savoir comment on saura distinguer quels sont les Cas où il serait possible de sauver la vie à l'enfant en pratiquant l'opération proposée, ou ce qui est la même chose comment on saura que tel enfant est, ou n'est pas, trop gros pour passer, avec l'aide des incisions hors de la Matrice de telle femme? A-t-on suppose que le plus grand Diamètre de la Tête d'un enfant (non comprimee) d'un enfant à Terme est de 4. Pouces, il s'ensuit évidemment, qu'en supposant que par la pression ce Diamètre devient de $3\frac{1}{2}$ pouces, il faut que que l'Orifice de l'Utérus se dilate d'autant. Or comme pour l'ordinaire la Tête des enfants à Terme porte dans son plus grand Diamètre plutôt au dessous qu'au dessus de 4. pouces, il s'ensuit que lorsque l'Orifice interne est n'est pas dilaté au point de décrire un Cercle de 4. pouces de Diamètre, au plus & dans les grands Sujets, & que l'enfant présentant la Tête ne pourrait franchir ce passage, il s'ensuit, dis-je, alors que ce passage est trop étroit & la première conséquence qui suit de là est de travailler à l'élargir. Si tous les efforts possibles & tous les moyens connus ne peuvent remplir cette indication, la première conséquence qu'on avait tirée et qui regardait la Matrice, change d'objet et regarde alors l'enfant: on conclut qu'il a la Tête trop grosse. Or s'il y a réellement entre la Tête & le passage une disproportion trop grande pour espérer avec quelque fondement qu'on puisse les voir se rapprocher mutuellement ou l'un des deux s'élargissant du point moyen de leur différence, il est presque indubitable qu'il faut ou en venir aux moies extrêmes, ou laisser périr l'enfant & peut-être la mère: mais si un Cercle de 4. pouces de Diamètre est celui que peut & que doit ordinairement décrire l'Orifice interne de la Matrice, il est probable que l'on risque peu à prolonger ce Diamètre, jusqu'à ce qu'il ait cette étendue, c'est ce qu'on exécutera par le moyen de l'incision, lorsque la difficulté vient du volume de la Tête ou du diamètre des Épaules.

2°. Mais si dans une femme grosse, à Terme, ~~mais~~ et en travail, l'Orifice interne se trouvait dilaté au point de décrire un Cercle de 4. pouces de Diamètre, & qu'on sentist néanmoins que cet espace ne peut admettre le volume de la Tête, les moyens ordinaires ne pouvant dilater le passage davantage, quel parti prendre?... Avant d'en prendre aucun, il est nécessaire de s'assurer si cette Tête est naturellement aussi grosse qu'elle paraît & si le reste du corps est à proportion, car il est assez

admirable que le Cas tel que nous le supposons soit l'effet d'une hydro-Céphale, & pour un enfant dont l'état est désespéré & sans ressource, il serait ridicule de faire subir à la mère une opération quelque légère qu'elle fût: Mais si cet enfant avait toutes les parties de son Corps à proportion de la tête, & que conséquemment il fût ~~bon vivant~~ ^{quelque possible} que puissent paraître les dangers dont nous parlerons plus bas, j'estime qu'on peut sans témérité tenter de terminer l'accouchement par l'ampliation du passage.

Ce que nous venons de dire concerne l'enfant encore entier dans la Matrice & suppose vivant; il y a encore deux autres Cas où la supposition restant la même, il a déjà commencé à sortir. Le premier, quand la tête ayant passé il reste arrêté par les épaules: le second quand tout le Corps étant dehors la tête demeure seule ~~et~~ comme enclavée au passage.

3°. Le premier de ces deux Cas n'est peut-être pas celui où l'incision de l'Orifice interne est le plus indispensable, parce qu'il est assez rare, quoique non pas sans exemple que des fœtus dont la tête a passé n'achevent pas de sortir. Cependant plusieurs obstacles peuvent quelque fois les en empêcher: Les épaules & le tronc entier peuvent être naturellement plus gros qu'ils ne devraient ~~être~~ à proportion de la tête: Il peut y avoir quelque vice singulier de Conformation; enfin il peut y avoir hydropisie du Thorax ou de l'Abdomen. Lors qu'on ne peut que conjecturer ces Cas, & que l'étroitesse du passage qui se contracte & se serre autour du Col ne permet pas de s'assurer bien positivement de la chose qu'on soupçonne c'est peut-être, dans la pratique ordinaire, un problème assez difficile à résoudre que de déterminer le moment précis au quel on ne doit plus hésiter à sacrifier la vie de l'enfant à la sûreté de celle de la mère; d'un enfant surtout, qui dans le Cas de monstruosité de quelque partie essentielle, ou d'hydropisie soit de la poitrine soit du ventre ne vivrait probablement pas longtemps. Sous moi, ne désespérant jamais des ressources presque incroyables de la nature, & persuadé que se hâter de l'interpréter, même avec toute la vraisemblance possible, c'est fort souvent la contredire, vu d'ailleurs le peu de danger qui suit une incision de quelques lignes je me déciderais sans peine à proposer ce moyen.

A peu près ^{sur} de ne pas augmenter le danger de la Mère, pourquoi ne pas mettre la Nature à portée de faire en faveur de l'enfant tout ce qu'elle peut? & quelles sont les bornes de son pouvoir! L'hydropisie ~~de~~ surtout celle du ventre, n'est peut-être pas aussi inévitablement mortelle que l'hydro-Céphale l'on se l'imagine, & a coup sur elle l'est moins que l'hydro-Céphale. La monstruosité de quelque partie n'est pas ^{non plus} une raison pour être raie^{ment} impitoyablement du nombre des vivants, qui peut assurer qu'un pareil fœtus qu'on tire par morceaux n'aurait pas pu vivre si on ne l'eût pas tué?... Il aurait vécu difforme. mais toujours, il aurait vécu.

4°. On n'ignore pas qu'un enfant bien vivant peut sortir de la Matrice les pieds devant (soit qu'il ait pris lui même cette posture soit qu'il qu'elle lui ait été donnée par l'artiste) & qu'alors si la tête est trop grosse pour suivre le corps l'Orifice interne peut se contracter & étrangler le cordon Umbilical, & dès là priver de vie l'enfant, & en outre s'opposer fortement à l'issue de cette tête hors de la Matrice. S'entrênerait-on pas cet accident en débridant cet Orifice un demi-pouce d'espace donne tant de facilité, & une telle incision est d'une si petite conséquence!

5°. Au rapport aux difficultés de la mauvaise situation, on sent bien qu'au moins qu'elles ne soient impliquées avec quelques uns des Accidents de la Section 1^{re} on pourra y remédier en retournant l'enfant, ainsi ce cas est à reporter à ceux dont nous avons déjà parlé.

~~Le cas d'un enfant qui sort de la Matrice par les pieds~~

on passe le forceps, en dégageant la tête si elle était enclavée.

S. III. Comme, jusqu'à ce que les Liguons aient été mis en jeu la vie de l'enfant dépend de la non-interruption du Commerce que le Cordon Umbilical & le Placenta entretiennent entre lui & la mère; le moindre accident qui arrive à l'un ou l'autre de ces deux parties si essentiellement nécessaires met la vie de l'enfant dans un danger plus ou moins urgent, à proportion que l'accident est par lui-même plus ou moins grave. On voit quelques femmes à qui il arrive que le Cordon Umbilical soit le premier, quand cet accident survient en présence de l'Artiste, il est rare qu'il ait des suites funestes: il le réduit, ou ~~il~~ accélère l'accouchement; n'ayant soin de le fomentier avec des Compresses ~~de~~ de vin chaud pour favoriser la Circulation en y entretenant une douce chaleur & de l'empêcher qu'il ne soit comprimé. Mais quand l'Artiste arrive après que le Cordon a demeure un certain temps à l'air & qu'il est froid, ou que par la pression de quelque partie voisine le sang étant arrêté dans son Cours le gonfle & le met hors d'état de rentrer: C'est alors qu'il me semble qu'il n'y a pas un instant à perdre pour sauver la vie de l'enfant: il en est encore temps, pour la même raison dont nous avons appuyé semblable conclusion plus haut (Voyez 1^{re} S. II. n^o 2^o). Il n'est pas nécessaire de remarquer que si le Cordon tombe depuis un long temps, étant absolument froid, sans pulsation, & livide, l'opération serait inutile par la même raison que nous en avons donnée dans cette présente Section, S. II. n^o 2^o.

2^o Quand, par quelque accident que ce puisse être, l'arrière fait se détache avant que l'enfant soit sorti, ou même quelque fois avant que l'Orifice interne soit dilaté assez pour y introduire quelques doigts, personne ne peut douter que l'enfant ne courre alors le danger le plus urgent de tous ceux dont nous avons parlé jusques icy, & que la mère, par la perte violente & continuelle qui accompagne cet accident, ne soit elle-même dans le peril le plus manifeste, Il n'est donc pas douteux que si l'incision du bourrelet de l'Orifice de l'Uterus est capable de terminer le travail plutôt que la Méthode ordinaire, c'est elle qu'on doit préférer: Mais auparavant de porter un jugement positif il est à propos d'examiner si en effet dans ce Cas l'Incision ~~est~~ ^{seroit} plus prompte capable de terminer l'accouchement plus vite que la manière ordinaire. C'est ce qui, après y avoir beaucoup réfléchi ne me ~~se~~ paraît gueres possible pour les raisons que j'en vais donner.

Section III.

Je ne suis point aveuglé des avantages que peut en certains Cas offrir cette Méthode d'inciser le Col de l'Uterus, au point d'en pas sentir que dans bien des Circonstances elle ~~est~~ ^{seroit} non seulement inutile mais encore nuisible, & que dans celle où elle paraît le mieux indiquée il y a des Conditions essentielles à observer pour la mettre heureusement en pratique.

Sur rapport aux Conditions générales il y a peu à ajouter à celles que prescrivait Roussel: "Sunt tibi considerandum" ~~non~~ ^{non} erit aliqua ne sit spes alio faciliiori modo letum nascendi. Deum sit ne mulier robusta ~~non~~ ^{non} an signa ~~lento~~ ^{lento} lethalia desint: precipue autem an non nimium ab Obstetricibus, aut ob ~~non~~ ^{non} numeros et violentos in partu conatus lousa fuerit, aut quorumdam tumorum Carnificina crudelitas ~~non~~ ^{non} dilacerata" &c. &c. Roussel de partu Cesareo.

Et ces Conditions j'en joindrai seulement deux qui concernent particulièrement et uniquement l'opération que je propose, la première que l'Orifice interne soit aminci par la pression de quelque partie de l'enfant & pour le mieux par celle de la Tête: la seconde qu'il y ait déjà un commencement de dilatation.

Ces Conditions que je regarde comme nécessaires, étant une fois admises comme telles il s'ensuit naturellement que l'opération proposée est ~~très~~ dangereuse, ou tout au moins inutile dans les Cas où nous l'avons rejetée. Dans les deux Sections précédentes & que nous allons rassembler ici sous le même point de vue.

1.^{re} lors que dans la perte de Sang il n'y a pas de Syncope ni de convulsion: l'avis que jusques à ce que ces Symptômes paraissent on peut présumer que les forces de la malade ne sont pas encore trop affaiblies, cependant il ne faut toujours attendre qu'on voie ces accidents pour juger qu'il est nécessaire de tout tenter promptement pour faire cesser l'hémorragie; l'état du pouls l'état habituel de la personne en santé, la sueur froide, la pâleur, le refroidissement. Symptômes qui quoiqu'ils arrivent le plus souvent dans la Syncope comme nous l'avons déjà dit, peuvent bien survenir aussi sans elle, ces ~~et~~ choses, dis-je, et leur degré serviront à tirer l'indication curative.

2.^{re} Dans l'inertie absolue ou atonie des fibres musculaires du fond de la Matrice, ~~qu'on~~ d'où on pourrait nommer la Totalité Detrusor fatuus à l'imitation de ~~Detrusor~~ Ruisch qui donne le nom de Detrusor Vrinæ ~~aux~~ à la totalité des fibres musculaires qui occupent le fond de la Vessie) la quelle Inertie ne serait pas compliquée ~~par~~ avec la convulsion des fibres musculaires de l'Orifice interne: ~~on le voit~~ ~~préciser~~ ~~quel~~ ~~bon~~ ~~usage~~ ~~de~~ ~~ce~~ ~~mot~~ ~~là~~ parce que tant que cet Orifice sera dilatable, et qu'il n'aura pas atteint sa plus grande étendue possible, ou tant qu'il y aura lieu d'espérer que la cause qui s'oppose à la dilatation doit bientôt ou cesser ou au moins ou diminuer d'énergie, il n'y aura pas d'impossibilité physique que l'accouchement se termine comme à l'ordinaire quoique sans douleurs, circonstances essentiellement dépendantes de l'Atonie des fibres du Detrusor fatuus.

3.^{re} Dans la faiblesse ou dans le cas de mort de l'enfant quand d'ailleurs il se présente de telle sorte que la forceps, Le Pochet enroulé, ou le tiret à trois branches de M^r Levret, peuvent être introduits.

4.^{re} Dans la grosseur soit naturelle soit monstrueuse de tout le fœtus entier ou de quelques unes de ses parties seulement, quand l'Orifice interne n'est pas dilaté d'à peu près quatre pouces & qu'on le sent dans la disposition prochaine de se dilater ~~jusques~~ ~~là~~; ou quand il l'est jusqu'à son plus haut point possible; dans le premier Cas parce que l'orifice peut encore se dilater, dans le second parce qu'étant dilaté autant qu'il peut l'être on courrait risque en faisant l'incision de pénétrer dans la Capacité du Ventre.

5.^{re} Dans l'hydrocéphale, parce qu'on ne voit point d'enfant guéri de cette maladie: dans l'hydropisie de poitrine par la même raison et par une autre encore plus évidente c'est que selon toute apparence l'enfant ne vivrait même pas un instant après la ligature du Cordon ombilical, dans l'utérus il vivait sans respirer, mais dès que le cordon est lié il faut ou qu'il meure ou que l'air s'insinue dans les poumons, ~~et~~ comment s'y insinuerait-il s'il est comprimé de toutes parts par un liquide qui n'est pas compressible et qui ne peut refuser ailleurs pour lui laisser la facilité de se gonfler par l'inspiration?

6.^{re} Quand le Cordon tombé est froid livide & sans battement, qu'il s'écoule de la matrice des humeurs folides et cadavereuses; parce qu'alors l'enfant est mort.

Enfin quand l'arrière-faix ^{est} détaché en entier ~~l'opérateur~~ ce qu'on peut conjecturer par la perte considérable qui accompagne cet accident, par ce qui est arrivé à la femme, et enfin par l'introduction des doigts; parce qu'alors l'enfant est déjà mort ou mourra bientôt à moins qu'on ne puisse terminer l'accouchement au même instant que le malheur arrive ce qui est très rarement possible, & d'autant moins encore qu'il y a moins longtemps que le travail a commencé, parce qu'en cas l'orifice n'est ni dilaté ni aminci au point où il faudrait qu'il fût ou pour tirer l'enfant sur le Champ, ou pour inciser l'orifice.

§ II Ces mêmes Conditions qui sont admises comme nécessaires démontrent que dans les Cas dont nous venons de faire l'énumération l'incision du bourrelet de l'Orifice interne de la Matrice est ou nuisible ou superflue, prouvent en même temps la possibilité dans les autres ou nous l'avons proposée, savoir

- 1°. Dans la Syncope, la Convulsion, la perte de Sang, si l'enfant est bien situé, si l'orifice est aminci & déjà un peu dilaté, & que les autres moyens, la main, le forceps &c. soient inutiles.
- 2°. Dans le spasme tonique, ou dans la rigidité des fibres musculaires de l'Orifice de l'Utérus dont la résistance excessive ne pouvant pas être surmontée par l'action de celles du fond de cet Organe, ~~cette~~ est peut-être l'unique Cause de la rupture de la Matrice quand aucune Cause externe n'a occasionné cet accident.
- 3°. Dans le Cas où quelque accident urgent indiquerait de terminer l'accouchement le plus promptement qu'il serait possible, et où l'Orifice ne serait pas au plus haut point de dilatation: Quelque fois même quoique cet Orifice parût dilaté autant qu'il peut l'être, si dans une Matrice affectée depuis quelques jours l'enfant se trouvait la tête enclavée au passage sans qu'il y eût de possibilité de lui donner une autre posture. & que cette tête fût si grosse qu'il n'y eût pas lieu d'en faciliter l'issue par le forceps seul, je ne crois pas qu'il y eût à balancer à faire une petite incision de chaque côté l'introduction du Forceps n'en serait que plus facile. & ainsi que le reste de l'opération. Nous examinerons plus bas les dangers aux quels on s'exposerait, & si leur considération doit réellement obliger à laisser périr l'enfant & la mère dans le cas dont nous parlons.
- 4°. Dans l'hydropisie du Ventre du fœtus, ainsi que dans le Cas de monstruosité de quelque de ses parties: puis qu'il n'est pas impossible de vivre ascitique, on contrefait & que si l'Arrière est d'un certain Volume en vain l'Orifice interne de l'Utérus se dilatera-t'il au plus haut point, la tête même du fœtus s'engagera dans le passage & sans que ce passage lui fasse obstacle elle n'avancera pas, le fœtus ascitique est d'un tel volume qu'il remplisse la Cavité de la matrice au point qu'il ne puisse glisser de dans à plus forte raison ne passera-t'il pas par l'Orifice interne: il faut donc le dilater ou tirer l'enfant. Comme le fit ce Chirurgien, dont parle Mauriceau, dans un cas semblable.
- 5°. Lorsque le Cordon Omphalique n'ayant pas encore perdu toute la Chaleur & qu'il y peut encore distinguer quelques pulsations obscures, ~~qu'il~~ est gonflé au point qu'il n'est pas possible de le réduire et que les douleurs étant faibles et lentes & même nulles, l'action des fibres musculaires de l'Orifice n'étant, par conséquent, que faiblement ou même point du tout contre balancée par celle du fœtus, le Cordon est dans le cas d'être comprimé et étranglé. ^{ne peut} ~~est~~ alors pas tant pour faire l'extraction de l'enfant qu'on pratiquerait l'incision de l'orifice, que pour lui conserver la vie, & cependant il n'est

pas douteux que l'accouchement s'en terminerait plus promptement, puis que ce serait autant de force qu'on ôterait par ces incisions, à l'Antagoniste du Détresse fatigé. . . . Dans certaines femmes chez qui les travaux de l'accouchement sont ordinairement longs & rudes & cependant infructueux comme on le voit quelque fois, c'est-à-dire, qu'après avoir beaucoup souffert inutilement elles accouchent ensuite sans douleurs, mais non pas toujours. Au danger soit pour elles soit pour leur enfant, dans ces femmes, dis-je, ne pourrait-on pas rendre ^{les} douleurs plus efficaces en diminuant, comme je viens de le dire la résistance des fibres Musculaires de l'Orifice interne? . . . Ne pourrait-on pas abréger ainsi, de plusieurs heures & même de plusieurs jours, des travaux qui a force d'être longs deviennent périlleux? . . .

Section IV.^{me}

Comme il ne suffit pas d'écarter une Opération démontrée nécessaire, mais qu'il faut en outre, être convaincu de la possibilité du succès & connaître les accidents qui peuvent survenir, ainsi que les moyens ou de les éviter ou d'y remédier quand ils sont arrivés, je vais traiter ces trois Objets, & en commençant d'abord par la Démonstration Géométrique de l'Opération & de sa possibilité.

Chapitre premier.

J'ai proposé cette opération. ~~car~~ pour des Cas où l'obstacle qu'elle est destinée à lever ~~est~~ se trouve en deux états fort différents: Dans les uns l'Orifice interne de l'Utérus est n'est pas ~~assez~~ dilaté autant qu'il le doit être naturellement pour le passage d'un enfant à terme: Dans l'autre au contraire (Section III.^{me} S. II. N. 3.) il est supposé autant dilaté qu'il peut l'être & d'où il suit qu'il n'est gueres possible de faire une incision ~~dans~~ même d'une petite étendue ~~sur~~ à cette partie sans courir le risque de pénétrer dans le ventre.

S. I. Le Vagin qui hors le temps de grossesse peut avoir cinq à six pouces de longueur, & à compter de l'ouverture externe de la Vulve jusqu'à l'Orifice interne, la perd toute au temps de l'accouchement après y avoir été préparé peu à peu par ~~un~~ l'augmentation lente & graduée de la Matrice. La forme de la Matrice est ^{un} Sphéroïde et son extrémité pointue est embrassée par la partie supérieure du Vagin dont la figure est à peu près cylindrique. Supposons que hors l'état de grossesse l'espace, la portion pointue de la Matrice, comprise entre les parois ~~extérieures~~ internes du vagin ait six lignes de Diamètre, ces six lignes se dilateront pendant la grossesse dans la même proportion que le reste de la Matrice; d'où il suit que si la Matrice n'a que deux pouces de large avant la grossesse et que pendant que dure ce dernier état elle acquiert un pied de Diamètre cet espace circulaire compris entre les parois internes du vagin & qui n'avait que six lignes verra augmenter son Diamètre jusqu'à trois pouces. Quand l'instant d'accoucher est venu, le poids de l'enfant & l'action de la cause qui tend à le chasser de la Matrice portant conjointement la dilatation de la partie inférieure de la Matrice au plus haut point possible l'ouverture de l'Orifice interne qui s'élargit peu à peu ne diminue pas l'étendue la Surface de cet espace circulaire elle échange seulement la ~~forme~~ figure en la réduisant d'une aire totale de Cercle à une superficie contenue entre deux Cercles concentriques éloignés à peu près l'un de l'autre d'un pouce et demi. Dans les femmes dont l'Orifice interne n'est pas assez dilatable pour le Cercle interne acquière 4 pouces de Diamètre, cet espace circulaire dont nous parlons regagnant par la nouvelle dilatation en tout sens, au temps de l'accouchement, qu'il perd successivement

par l'augmentation de l'ouverture de l'Orifice interne, les Cordes restent toujours à peu près dans le même rapport par l'égalité augmentation de leurs Diamètres: du pas cette supposition (certainement très admissible) il suit qu'il restera environ un pouce & demi de Chaque côté, qu'on pourra inciser sans courir le risque de pénétrer dans le ventre: Donc &c... Cette incision se réouvrira après l'effric de l'enfant, du Placenta, & des Lochies a une simple ligne sans donner une plus grande ampleur à l'Orifice interne, parce que la membrane externe n'étant point divisée empêchera l'arteriel & concourra par son Elasticité à la réunion des plaies en favorisant la contiguïté de leurs lèvres.

S. II. Dans la Sect. précédente S. II. n. 3. il a été dit qu'on ne croirait pas qu'on dût balancer à faire l'incision du bourrelet de l'Uterus dans le Cas ou la tête d'un fort gros enfant demeurait scd. depuis plusieurs jours &c. &c.; en effet les raisons qu'on pourrait apporter contre ce sentiment ~~ne~~ sont tirées que des accidents qui peuvent suivre une semblable incision. Il y en a deux principaux, particuliers au cas proposé, les autres lui sont communs avec tous les autres Cas ou l'opération peut être pratiquée. Ces deux Accidents principaux sont l'épanchement des Matieres dans la Capacité du bassin & la hernie dans la Matrice ou dans le Vagin.

1^o Le Dernier n'est pas le plus fâcheux. L'Elasticité du Viscere lésé est telle qu'aussitôt que la hernie serait réduite, le passage lui serait formé sans retour: & la réduction n'est pas difficile, surtout, si comme il est de la prudence de le faire, le Chirurgien qui est dans le Cas de l'appréhender l'en éclaircit aussitôt que l'arrouchement est terminé. L'épanchement des Matieres dans le bassin est des difficultés bien plus grandes & des Suites aussi fâcheuses. S'il n'était absolument pas possible d'éviter ce malheur il n'y aurait pas lieu de jamais exécuter l'opération proposée dès que l'Orifice de la Matrice aurait acquis son dernier degré de dilatation. Si malgré toutes les attentions qu'on apporterait il arrivait qu'on pénétrât dans le ventre en faisant l'incision comme je l'ai faite, aux parties latérales; comme le traitement serait le même que pour tous les autres épanchements je ne m'étendrai pas sur les procédés Curatifs: je me bornerai seulement à proposer une Méthode prophylactique. C'est infiniment plus avantageux de pouvoir éviter le mal que de le savoir le combattre quelque fois qu'on pût être du Succès.

2^o Dans tous les Cas dont il a été question jusques ici en proposant l'incision de l'Orifice interne j'ai toujours entendu parler de la manière qui m'a réussi, c'est à dire, de faire une petite incision à chacune des parties latérales du passage dans la direction d'une ligne droite qui passant par chacune des Cavités Cotyloïdes des Os des Hies couperait à angles droits la ligne verticale du Corps. Dans le cas présent il est plus à propos de faire incision dans un endroit où, suppose qu'on pénétre on a lieu de présumer que la Situation qu'on fait garder à la malade s'opposera à l'épanchement des matieres dans la Capacité du bas ventre en favorisant leur écoulement par le Vagin. Cette Incision se pratiquera donc à la partie presque antérieure de l'Orifice interne, & selon la direction (qu'on peut se représenter par une ligne droite tirée ~~de la jonction de l'Os à Sacrum~~ ^{au p. des Hies} de la jonction de l'Os à Sacrum ^{au p. des Hies} de la Symphyse du Subis). Selon la direction, dit-je, elle coupe une plus grande quantité de Fibres (Planch. II. fig. 1^{re} Lett. CD.) que lors qu'on fait faire, comme dans les autres Cas, angle droit au tranchant de l'instrument avec le bourrelet (id. ibid. Lett. AB.). C'est visible par la fig. VIII. planche I^{re} que l'Uterus ne courrait aucun danger, & pour s'en rendre encore plus certain on pourrait introduire d'abord une Algèze dans la Vessie pendant qu'avec l'index de l'autre main insinuée dans le vagin & pressant un peu la partie Supérieure on ~~l'en~~ apprendrait au juste la Situation de l'Uterus, & jus qu'on en peut conduire l'instrument tranchant sans danger.



XXII 9°. On demandera, pour quoi, s'il est moins dangereux de faire une incision à la partie antérieure de l'Orifice, ne le fait-on pas dans tous les cas sans exception plutôt que d'inciser les parties latérales? On répond à cela, que dans le cas Supposé s'il fallait faire deux incisions on les pratiquerait aux parties latérales au hazard de ce qui pourrait en arriver, car on ne ferait pas la Seconde à la partie postérieure outre la proximité du Rectum, ce serait provoquer l'épanchement ou au moins la Stagnation des humeurs. Quand on ferait deux incisions parallèles ~~aux~~ deux Côtes de la vessie comme les indiquent les figures VII. & VIII de la Seconde planche, Lett. A.C. fig. 7. &c. fig. 8. il n'en résulterait pas une facilité assez Supérieure à celle que procurerait une seule pour qu'on preme ce parti: elles seraient trop proche l'une de l'autre. D'ailleurs dans le cas dont il s'agit il est probable qu'une seule incision Suffira, puis qu'on suppose l'Orifice déjà autant dilaté qu'il a continué de l'être en pareille circonstance.

4°. Si les fibres Charnues de l'Orifice interne, le total des quelles pourrait estre nommé Constructeur Vteri, n'étaient qu'un bouquet de fibres Orbiculaires & continues, une seule & unique incision qui les diviserait toutes, n'importe où elle fût placée, Suffirait sans doute pour lever l'Obstacle qu'elles peuvent opposer à l'issue du Fœtus: mais elles ne paraissent pas telles. C'est qu'un tissu confus d'une multitude de fibres entrelassées en tout sens. & dont, vu leur effet, on peut penser qu'une des extrémités s'épanoït dans la membrane qui les recèle & l'autre s'attache sur la fibre suivante (St. II. fig. 1.^{re}). De cette Construction il s'ensuit qu'une seule Incision ne relâche qu'imparfaitement l'Orifice, ce qui quelque fois peut Suffire, quand il y a lieu de présumer que la disproportion entre le Fœtus & le passage n'est pas fort considérable, telle est la Circonstance qui fait le sujet de ce S. mais il s'ensuit en même temps que deux incisions Diamétralement opposées (St. II. fig. 1.^{re} A.B. fig. II.^{me} A.F.E.B.) réduisent à presque rien l'Obstacle résultant de l'inextension ou de l'inextensibilité de l'Orifice qui alors doit s'ouvrir comme une bourse dont les Cordons étant coupés on écarte les Serois sans le moindre effort.

Chapitre Second.

En parlant des accidents qui peuvent suivre l'Opération dont il s'agit, j'en ai parlé dans le Chapitre précédent & j'en parle encore que de ceux qui peuvent estre, ou évités par quelque attention particulière dans le manuel de l'Opération, ou combattus par le secours de la main: Je ne dirai donc rien de la fièvre de la douleur, des Nausées &c. qui pourraient Survenir, & ayant traité dans l'autre Chap. S. II des accidents propres à l'incision du bourrelet de l'Orifice dans la Circonstance particulière qui y est Supposée, je traiterai dans celui-ci des accidents communs à cette Opération en général, savoir l'hémorragie, la Lésion de quelqu'une des parties de l'enfant, celle de quelqu'une de celles de la Mere.

S. I.^{er} L'hémorragie, (On voit bien que je ne parle que de celle qui serait produite par l'ouverture d'un vaisseau un peu considérable qui se serait trouvé dans le chemin parcouru par la Lane tranchante, il n'est à craindre qu'autant que le vaisseau ouvert est ~~plus~~ gros, & bien que le Diamètre de tous les vaisseaux Sanguins de l'Uterus augmentent de Diamètre à mesure que cet Organe s'étend. La Contractilité est telle qu'à moins que la trome Ouverte ne fût naturellement & dans l'état même de vacuité de la Matrice, fort considérable, ne qu'il n'est pas ordinaire en cette partie ou qu'il fût Anévrysmatique, ce qui est au moins aussi rare, elle Suffit pour arrêter l'écoulement du sang. Cependant ces cas quoique rares n'étant pas impossibles il faut savoir quel parti prendre si on les rencontraient. Je pense qu'après s'être assuré de la quelle des plaies, s'il y en a deux, vient le sang (ce qui se ferait en insinuant un ou deux doigts dans le Vagin le plus profondément qu'on pourrait & jusques dans les plaies mêmes, alors on sentirait la chaleur & le mouvement du sang) au moyen d'une Sente garnie d'Agaric ainsi qu'on le fait lorsqu'un pareil accident arrive dans

L'opération de la Taille, on parviendrait vraisemblablement à l'arrêter. Si l'on ne pouvait découvrir de quel côté est situé le vaisseau ouvert le plus sûr parti serait de se servir d'une Canulle plate, assez large pour occuper, garnie d'agaric, l'étendue des deux plaies à la fois, et d'en appuyer l'efficacité ~~par~~ en garnissant médiocrement ferme le Vagin, pendant que par une compression convenable sur la Région hypogastrique on concourrait avec ~~avec~~ l'action de l'agaric à la formation du Caillot à l'ouverture du Vaisseau.

S.II. La Lésion de quelque partie de l'enfant. faisant l'opération ainsi que j'en ai faite la partie que présente l'enfant est la première exposée à être blessée par la pointe du Bistouri, mais au moyen de l'instrument dont je vais donner la description on est suffisamment en garde contre ce danger. ~~placée en sa place~~ Dans certaines positions de l'enfant lorsque le Cordon Omphalical est un peu long il pourrait arriver qu'en glissant près de l'ouverture, il serait dans le Cas d'être effleuré par l'instrument tranchant, mais comme cet instrument est tel qu'on peut sans risque de se blesser lui-même insinuer son doigt entre lui & la partie de la Matrice qu'il doit couper il est aisé d'éviter que le Cordon ne s'engage sous la lame. Soit par la façon dont on l'introduit, soit en le repoussant avec le bout du doigt.

S.III. La Lésion de quelqu'une des parties de la Mere, lesquelles n'auraient pas dû être blessées pour que l'opération eût été bien faite. La seule partie de la Mere, exposée à être blessée mal à propos est le Vagin dans quelque endroit au dessous de l'incision, quand on fait le débridement aux parties latérales; & L'Urethre quand on fait l'incision antérieure proposée, n° 3. S.II. du Chap. précédent. N'est assez démontré par la fig. VIII. de la planche I^{re} citée au même endroit que l'ouverture de l'Urethre n'est gueres possible pour peu qu'on se représente dans le temps de l'opération la structure des parties sur lesquelles on opere. A l'égard du Vagin quoique les plaies qu'on y pourrait faire ne fussent pas dangereuses comme il est toujours bon de les éviter j'ai ajouté une seconde Chappe à l'instrument que je propose, au moyen de la quelle La Lame tranchante ne peut ~~longs~~ toucher que ce qu'elle doit couper comme je vais l'expliquer tout à l'heure.

Septieme & dernière question

Quels sont les instruments les plus capables d'exécuter avec promptitude & sécurité l'opération qui fait le sujet de ce Memoire, & quel en est ~~un~~ le Manuel?

Dans le Cas dont j'ai fait le rapport à l'Académie Royale de Chirurgie un seul instrument m'a suffi: mon doigt m'a servi de guide et de gardien pour conduire sans danger un bistouri courbe ordinaire sur le lieu que je voulais couper. Mais tous les autres cas où je présume que l'incision proposée peut avoir lieu, ne sont pas aussi simples, & dans celui même que j'ai décrit on ne peut disconvenir que le bistouri courbe ordinaire n'ait des inconvénients assez grands qu'il était nécessaire de chercher à éviter. Lorsque l'enfant, par exemple, est arrêté par les Epaules le volume & la figure ronde de la Tête empêchent ~~en~~ qu'on n'introduise facilement un bistouri courbe ordinaire. Le Volume & la figure des Epaules font le même Obstacle lorsqu'il est devenu pris par la Tête, & quoique quelque fois selon qu'il serait tourné, il ne fût peut-être pas ~~absolument~~ absolument impossible de faire les Incisions sans un instrument particulier, il y aurait cependant plus de difficulté à surmonter, & plus de Sujets de craindre de blesser ou l'enfant ou la Mere. Il faut donc quand une pareille opération se trouve nécessaire, être muni pour l'exécuter de l'instrument le plus convenable: & tout mûrement considéré j'ai cru que celui dont je vais faire la description satisfaisait à toutes les vues & renfermait le plus des avantages qu'on peut souhaiter.



La principale piece de l'Instrument, c'est à dire, celle qui porte la Lame tranchante & ressemble au Croissant des Jardiniers. Je la nommerai hystérotome & l'Operation qu'elle exécute hystérotomie.
 Pl. I.^{re} La Tige ~~cau~~ CEFH, & d'acier poli, longue de six pouces quatre lignes, est plate et par conséquent peut se diviser en deux faces & deux côtés. La largeur des faces va en augmentant depuis le Croissant jusqu'au Manche, au lieu que celle des Côtés est égale d'un bout à l'autre. Le Côté postérieur, continu à la Convexité de la Lame, à quatre lignes du manche fait avec l'axe de ce même Manche un angle d'environ 17° & dans l'espace de quatre lignes depuis cet Angle jusqu'au manche F est percée une Mortaise, G, pour l'usage qu'on va voir tout à l'heure. Le Croissant AB n'est tranchant que dans une partie de son bord interne parce qu'il est inutile qu'il le soit dans une plus grande étendue. Sur chacune des faces à peu de distance du bord, OM, continu à la concavité du Croissant, est creusée une rainure ^{CD} exactement parallèle ^{OP} à ce bord OM, lequel, en outre est arrondi comme on le voit dans la figure IKKL mise à côté et représentant une coupe transversale de la Tige. La Soie N, de cette Tige est rivée au bout inférieur du manche de bois, EF, sur lequel on a creusé quelques sillons au moyen desquels on le tient plus fermement.

Fig. II. La seconde partie de l'Instrument est la Chasse qui couvre la Lame dans le temps de l'introduction dans la Matrice. Cette seconde partie peut être ~~la~~ divisée en deux autres, La Chasse proprement dite, & la Tige de cette Chasse. Cette Chasse proprement dite est un morceau d'ivoire ou d'écaille. (On pourrait la faire d'argent ou d'acier, mais quelque fini que soit le poli que l'on peut donner aux Métaux on doit toujours, autant qu'on le peut, préférer des Substances moins compactes) dont la partie supérieure plus large que la lame de l'hystérotome et ayant même Courbure ~~que la~~ qu'elle, est fendue depuis le Sommet, A, exclusivement jusques à 7 ou 8 lignes de l'autre extrémité, D, et arrondie exactement tant ~~le~~ du côté de la concavité que de celui de la Convexité. La figure, kk hh g, qui est placée à côté et jointe avec un Crochet représente comment à la fin, B, de la Concavité les deux lames s'écartent l'une de l'autre en kk, & se rapprochent ensuite mutuellement pour former les languettes, hh, C, qui doivent s'engrainer dans les rainures de la Tige. La ligne ponctuée ba, indique jusqu'où les lames sont divisées & l'espace de pont, ba a, qui s'expose à leur écartement. L'extrémité inférieure D est fixée sur la tige, E, au moyen de quelques vis à tête plate & perdue. Cette Tige est d'acier poli, elle a deux surfaces, l'une plate qui s'applique sur le bord postérieur, GH, de l'hystérotome, & l'autre convexe, comme on le voit par la coupe transversale, de. L'extrémité inférieure F est d'une figure quarrée et est percée de deux Mortaises qui la pénètrent en se coupant à angles droits, l'une des quelles lors que la Chasse est placée, se trouve dans la direction de la Mortaise G de l'hystérotome. Cette Extrémité fait avec le reste un angle semblable à celui du bord postérieur de l'hystérotome. ~~se joint~~ A la surface inférieure qui termine cette dernière partie pend à une petite chaîne une Clavette G la quelle sert, lors que la Chasse est en place, à la fixer sur la Tige de l'hystérotome en l'introduisant dans les Mortaises qui se trouvent dans la même direction.

Fig. III. La troisième partie de l'Instrument, je l'appelle la Chappe. La partie supérieure AB est d'ivoire comme dans ~~la~~ la Chasse. Elle porte une Entaille, G, assez profonde pour que la lame de l'hystérotome puisse y entrer à la sortie d'entre les lames de la Chasse. Cette piece est un solide presque ovale ainsi qu'on le voit par la fig. GF qui en représente une coupe transversale & parallèle à l'axe, ou bien qui représente cette même piece vue de face. La partie inférieure est d'acier poli et peut se diviser en trois, la première, BC, est une gouttière dont les bords se rapprochant mutuellement forment les languettes qui entrent dans la Rainure de la Tige. La seconde, CD, consiste en deux espèces d'oreilles qui portent à leur extrémité une Mortaise, D, égale à la Mortaise F de la partie inférieure de la Chasse, et destinée à se trouver dans la direction de cette dernière lors que la Chasse & la Chappe sont placées sur la Tige de l'hystérotome. Enfin la troisième est une sorte de manche convexe en dehors et concave en dedans, arrondi & d'une

XXI

Certaine largeur afin qu'on le tienne à pleine main, car c'est cette partie qui devant le point d'appui dans le tems de l'opération. Elle s'écarte environ de deux poices de l'axe du manche de bois.

Manuel de L'hystérotomie

On commence par oindre d'huile toutes les pieces de l'instrument & surtout celles qui doivent glisser les unes contre les autres comme la Tige & les rainures, ainsi que les Chasses la Chasse la Chappe & leurs languettes.

Ensuite on adapte la Chasse sur la Tige & sur la Lame en faisant d'abord la convexité de cette dernière entre les languettes de la Chasse quand cette convexité est parvenue en D (fig: II^a) elle entre dans la fente, D, a, et baisse autant qu'il le faut pour que les Languettes se trouvent dans l'alignement des Rainures, on pousse alors la tige qui entre dans la Coulisse & la ~~Lame~~ Lame va se cacher toute entière entre les lames de la Chasse. [#] Cela fait on insinue l'extrémité du Croissant dans la matrice: on commence par le présenter à plat afin qu'il entre plus aisément. Quand il est entré jusqu'à la moitié de la courbure, quand on veut faire la plus grande incision possible, et moins que cela, quand on juge qu'une plus petite sera suffisante, quand, dis-je, il est entré autant qu'on le croit nécessaire on le retourne de telle sorte que le bord MO fig: I^{re} regarde la Cuisse, du côté au quel on veut faire l'incision, pour placer ainsi l'instrument avec plus de facilité, on insinue l'index de la main droite, si c'est le Côté droit qu'on incise le premier, afin de faire de la place & que l'instrument ne contonde ~~pas~~ ni la Matrice ni la partie que présente l'enfant, & en même tems afin de s'assurer qu'aucune partie de l'enfant ne s'engage sous la Lame comme cela pourrait arriver au Cordon Omphalical, qu'il faudrait un peu repousser avec le bout du doigt. Ensuite changeant de main & prenant de la droite le manche de l'instrument, on prend de la gauche, la Chappe, & la présentant à la partie inférieure de la Tige on engraine les languettes dans les rainures & on pousse jusqu'à ce que la partie supérieure des languettes de la Chappe se trouvent arrêtées par la partie inférieure de celles de la Chasse. Alors les Oreilles, C fig: III, entre lesquelles vient de passer le ~~Manche~~ une petite partie du haut du Manche de bois, se trouvent embrasser la partie inférieure, MEFG, de la Tige de l'hystérotome et la partie inférieure F, du bas de la Chasse, & leur Mortaise, D fig: III, se trouvant dans la direction de la Mortaise F, fig: II, on retire la Clavette de la Mortaise ou on l'avait mise d'abord pour fixer la Chasse sur la Tige, & on la place dans la Mortaise, D fig: III.; Au moyen de quoi & conjointement avec le secours des Languettes engagées de part et d'autre dans les rainures, la Chasse & la Chappe se trouvent fixées invariablement l'une à l'autre. Or il est évident que l'espace qui se trouve, fig: IV entre la Chasse & la Chappe est occupé par la portion du bourrelet de l'Orifice qu'on veut inciser & que cette portion ne se trouve nécessairement seule. Alors empoignant fortement le Manche de la Chappe de la main gauche & le tenant immobile, on prend de l'autre main le Manche de bois de l'hystérotome & on le tire à soi autant qu'il peut venir, c'est à dire jusqu'à ce que la Lame tranchante soit venue se rendre dans l'entaille profonde qui l'attend sur la Convexité de la Chappe. Les lignes ponctuées de la fig: IV indiquent le chemin que parcourt la Lame tranchante. N'est clair, par ce mouvement, que ce qui se trouve entre la Chasse & la Chappe est coupé, et l'est nécessairement seul. Cela fait d'un côté on en agit de même pour l'autre & l'opération sera faite.

On assujettit alors ces deux pieces ensemble par le moyen de la Clavette, G, fig: II, qu'on place dans la mortaise ^{celle 2. 10} de la partie inférieure du bas de la Chasse qui se trouve alors parallèle à la mortaise de la Tige +

P
 I
 F
 Je suis tout le moiens que j'ai imaginé pour suppléer aux forces insuffisantes de la nature. L'ignorer
 pas qu'on serait inexcusable si l'on entreprenait une Operation sans en avoir appréciée les avantages &
 les dangers, & comparer les Accidents qu'on doit craindre avec les ressources qu'on peut avoir pour les
 éviter ou pour les combattre: mais quand, après la nécessité bien constatée de la faire ou de laisser
 la malade exposée à une mort certaine, il se trouverait un accident unique mais terrible
 irrémédiable même, si l'on veut, le quel n'aurait pourtant qu'un degré de possibilité selon lequel
 il pourrait peut-être arriver une fois sur cent, il faut alors se contenter de l'avoir prévu
 & dès qu'on en a fait son pronostic, on peut, sans encourir le reproche d'ignorance ou de témérité
 s'en rapporter de quelque chose à son bon destin... Le hazard n'est autre chose que la nature
 en tant qu'elle nous montre les effets sans nous éclairer sur les causes; & c'est dans de pareilles
 circonstances, qu'un Chirurgien doit s'armer de Courage & se dire Audaces fortuna juvat
 Au reste, pourtant, je le repète: je ne fais ici que proposer mes idées à l'Académie
 c'est d'après son jugement que je serai le premier à les combattre et à les oublier, ou à les
 suivre & à les perfectionner

le 29. Octobre 1761. *Quasivi celo Lucem* V. Philippe. M^{re} arts &
 en Chirurgie à Chartres en Bauche.

Explication de quelques figures dudit qui ne
 sont pas citées dans le Corps du Memoire ou qui n'y
 sont pas assez détaillées.



Planche premiere. Figure Cinquieme.. Cette figure se rapporte au S¹^{er} 2^e du 1^{er} Chap:
 de la lection IV. Elle represente le Corps de la matrice et une portion du Vagin dont on a enlevé
 la partie antérieure afin de laisser voir la partie inferieure et pointue de la matrice contenue
 entre ses parois internes. La ligne ponctuée AB Diametre de ce qu'on voit de la Matrice dans le Vagin
 est supposée longue de six lignes. Au reste cette figure est de la Matrice d'une femme qui a déjà
 accouché car dans les Vierges il n'y a point ainsi d'allongement de la Matrice dans le Vagin.
 EADBFG est la Coupe du Vagin et son Epaisseur. a, b, est l'origine des Ligaments ronds.
 a, c, b, D est l'espace vuide entre les parois de la Matrice dont le fond c, est beaucoup plus epais
 que les Côtés.

La figure VI. Represente le Cas qui fait le Sujet de l'Observation que j'ai l'honneur d'exposer
 à l'Académie. Les Lignes ponctuées marquent jusqu'où j'ai prolongé les incisions que j'ai faites.

La figure VII. se rapporte au S¹^{er} II du 1^{er} Chap: de la lection IV^{me}, et montre la Coupe de la matrice
 à sa jonction au Vagin, l'Orifice dilaté autant qu'il peut l'être et ne l'étant pas encore assez. B montre
 l'endroit sur lequel repose le Corps de la Vessie. A, C les incisions que je propose et leur direction, qui
 n'est point, comme dans les autres Cas, identique aux rayons d'un Cercle.

La figure VIII. se rapporte au même endroit du même Memoire que la précédente. A, la Cavité de la Matrice.
 B la Vessie; c c les Guaisons. DD, les Ligaments ronds.

Planche Seconde

Figure Seconde. Le Cercle figuré par des hachüres represente la jonction du Vagin et de la
 Matrice dans une femme supposée au point d'accouchement et dont l'Orifice interne n'est pas assez
 dilaté. Cette figure se rapporte au premier S du 1^{er} Chap: de la troisieme Section. On dit que